

30) RESSECÇÃO EXTENSA DE PAREDE ANTERIOR ABDOMINOPÉLVICA EM DUAS MULHERES COM CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DISTINTAS E TUMORES SEMELHANTES.

Autora: Christine Marques de Miranda.

Coautores: João Alberto Barros; Maria das Graças Lapenda; Joaquim Branco; Mário Rino; Rogério Santos.

Instituição: Hospital de Câncer de Pernambuco.

Introdução: O crescimento lento de tumores desmoides, classificados anátomopatologicamente na categoria de tumores benignos, contribui para o retardo no tratamento cirúrgico e para a grande extensão destes tumores. **Método:** apresentação de dois casos clínicos. **Resultado:** Duas mulheres com condições clínicas e faixa etárias distintas, são portadoras de tumores semelhantes em localização e extensão. Apresentamos detalhes técnicos das cirurgias, dificuldades de obtenção de margens adequadas e morbidade pós-operatórias. A importância do trabalho da psicologia, nutrição, ccih e fisioterapia para o sucesso da recuperação. **Conclusão:** o tumor desmoide geralmente apresenta-se em serviços de oncologia com história de recidivas e como grandes massas, aumentando a complexidade do tratamento cirúrgico.